QUESTIONNAIRE REVISION CTM2 (partie N°2)**1/ Un couple rédox s'écrit :**

- Ox / red
- Red / ox
- Ox - Red
- Red - Ox

2/ Le couple composé d'ions cuivre (II) et d'atome de Cuivre s'écrit :

- $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})}$
- $\text{Cu}_{(\text{s})} / \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $\text{Cu}^{+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})}$

3/ L'ion Cu^{2+} est un atome de cuivre qui a :

- perdu deux électrons.
- gagner deux électrons.
- perdu deux protons.
- gagner deux protons.

4/ La demi-équation qui traduit la transformation du métal fer en ions fer (II) est :

- $\text{Fe}_{(\text{s})} = \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $\text{Fe}_{(\text{s})} = \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^{-}$
- $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} = \text{Fe}_{(\text{s})} - 2 \text{e}^{-}$
- $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} = \text{Fe}_{(\text{s})}$

5/ Quelles sont les équations d'oxydoréduction correctes :

- $\text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Fe}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $\text{Fe}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})}$
- $\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Fe}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $\text{Fe}_{(\text{s})} + 2 \text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{Ag}_{(\text{s})}$

6/ Lors d'une réaction d'oxydoréduction, il y a échange :

- d'électrons.
- de protons.
- de neutrons.

7/ Pour le couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$, l'ion Mn^{2+} :

- est un oxydant.
- est un réducteur.
- cède des électrons.
- capte des électrons.

8/ Dans la demi-équation $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^{-} = \text{Zn}_{(\text{s})}$, l'ion zinc (II) est :

- solide.
- l'oxydant.
- le réducteur.

9/ La demi-équation redox du couple $\text{I}_2 / \text{I}^{-}$ peut s'écrire :

- $\text{I}_2 + \text{e}^{-} = \text{I}^{-}$
- $\text{I}_2 + 2 \text{e}^{-} = 2 \text{I}^{-}$
- $\text{I}_2 = 2 \text{I}^{-} - 2 \text{e}^{-}$

10/ D'après les deux demi-équations suivantes :

$\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{e}^{-} = \text{Ag}_{(\text{s})}$ et $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^{-} = \text{Cu}_{(\text{s})}$, l'équation de réaction ayant lieu entre les ions argent et le cuivre métallique s'écrit :

- $\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $2 \text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})} \rightarrow 2 \text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + 2 \text{Cu}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ag}_{(\text{s})} + 2 \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$
- $2 \text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow 2 \text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})}$

11/ Réaction entre les ions chlorures et les ions perchlorate :

- Ecrire la demi-équation du couple $\text{Cl}_2 / \text{Cl}^{-}$ dans le sens de la production du dichlore gazeux :
.....
- Ecrire la demi-équation du couple $\text{ClO}_4^{-} / \text{ClO}_3^{-}$ dans le sens où l'oxydant réagit pour former le réducteur :
.....
- Dédurre des deux demi-équations précédentes, l'équation de réaction ayant lieu entre les ions Cl^{-} et les ions perchlorate ClO_4^{-} :
.....

12/ Action du cuivre sur le zinc

Une lame de zinc de masse $m_{\text{Zn}} = 3,27 \text{ g}$ est plongée entièrement dans un bécher contenant un volume $V = 200 \text{ mL}$ de solution de sulfate de cuivre de concentration en ions cuivre $C_{\text{Cu}^{2+},\text{i}} = 1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

L'équation chimique de la réaction modélisant la transformation chimique est :

On laisse la réaction se dérouler quelques instants, puis on retire la lame de zinc et on détermine la concentration molaire en ions cuivre restants dans la solution $C_{\text{Cu}^{2+},\text{f}} = 2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Donnée : Masse molaire atomique du zinc et du cuivre : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- Calculer les quantités de matière initiales des réactifs notée $n_{Zn,i}$ et $n_{Cu^{2+},i}$.
.....
.....
.....
- Compléter de manière littérale le tableau d'avancement de la réaction en utilisant les notations $n_{Zn,i}$ et $n_{Cu^{2+},i}$.

Équation – bilan					
État du système	Avancement x (en mol)	Quantités de matière (en mol)			
État initial					
Etat en cours de transformation					
État final					

- Montrer que la valeur de l'avancement final x_f (au moment où l'on retire la lame de zinc) est égale à $1,60 \cdot 10^{-2}$ mol.
.....
.....
.....
- Déterminer la masse de cuivre solide formé (au moment où l'on retire la lame de zinc).
.....
.....
.....

13/ Dismutation du dichlore

L'équation de dismutation du dichlore peut être modélisée par la réaction d'oxydoréduction suivante :

On considère qu'initialement, la quantité de dichlore dissous vaut $n_{Cl_2,i} = 10,0$ mmol. Il y a formation d'ion chlorure en quantité $n_{Cl^-,f} = 7,3$ mmol.

- Construire le tableau d'avancement de la transformation, sans se préoccuper de l'évolution des quantités d'eau et d'ion hydrogène qui sont considérées comme étant en excès.

Équation – bilan		$Cl_2 (aq)$	+	$H_2O (l)$	→	$HClO (aq)$	+	$Cl^- (aq)$	+	$H^+ (aq)$
État du système	Avancement x (en mol)	Quantités de matière (en mol)								
État initial										
Etat en cours de transformation										
État final										

- Calculer l'avancement final x_f de la réaction. En déduire le caractère total ou non de la transformation étudiée.
.....
.....
.....
.....
.....